

Aktuality

v chemickej ochrane záhradných plodín

Spracoval: Ing. Juraj Matlák

(Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis)

Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. Ďakujeme.

Obdobie: 15.03.2019 - 21.03.2019

Plodina	Škodlivý činiteľ	Prípravok	Poznámky
broskyne	Kučeravosť listov broskýň	CHAMPION 50 WG CUPROXAT SC KUPRIKOL 50 SULKA K	- prvý preventívny postrek meďnatými alebo sírnatými prípravkami (Sulka) v štádiu nalievania sa púčikov bez ohľadu na priebeh počasia; teplota v čase postreku sa má pohybovať nad 7 °C - na ďalšie postreky po vypučaní sa môžu použiť len organické fungicídy (Syllit)
egreše	Múčnatka na ríbezliach a egrešoch	ZATO 50 WG	- prvý preventívny postrek citlivých odrôd tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí - pre veľkovýrobu sú registrované prípravky Discus a Sulfurus; rovnakú účinnú látku ako Sulfurus (síru) obsahujú aj v malom balení dostupné prípravky Kumulus a Thiovit - sírnaté prípravky neaplikovať pri teplote nad 25 °C
jahody	Roztočik jahodový	ORTUS 5 SC VERTIMEC 018 EC	- prvý postrek pri pučaní, druhý pred začiatkom tvorby kvetných pukov; - ošetrenie je potrebné len tam, kde sa zistili príznaky napadnutia rastlín (zakrpatené a odumierajúce srdiečkové listy)
marhule	Moníliová spála kvetov a výhonkov	PROLECTUS SIGNUM	prvý preventívny postrek až na začiatku kvitnutia (keď sa otvoria prvé kvety) , druhý pri dokvitanií
ovocné dreviny	Preventívny postrek proti pôvodcom hubových a baktériových chorôb	CHAMPION 50 WG CUPROXAT SC KUPRIKOL 50	všetky druhy ovocných drevín sa môžu ošetriť uvedenými meďnatými prípravkami ešte pred vypučaním pri teplote nad 7 °C proti pôvodcom rôznych hubových a baktériových chorôb
ovocné dreviny	Puklice Prezimujúci škodcovia Piadivky Vošky štítničky	KARATE ZEON 5 CS MOSPILAN 20 SP PREDJARNÝ POSTREK	- výdatný zmývaci postrek všetkých ovocných drevín krátko po vypučaní, ale najneskôr pred kvitnutím - v čase postreku sa má teplota pohybovať nad 10 °C
ovocné dreviny vinič	Chloróza ovocných drevín a viniča	FLORASIN LIGNOVIT Fe	v oblastiach, kde bol v minulom roku zistený výskyt chlorózy, aplikujeme uvedené hnojivo vo forme zálievky do rýh vykovaných po obvode koruny

			stromov a ku koreňom viniča
slivky	Znetvorenie plodov spôsobené grmaníkom slivkovým	CHAMPION 50 WG CUPROXAT SC KUPRIKOL 50	prvý preventívny postrek v štádiu nalievania sa púčikov najmä v prípade daždivého počasia; teplota v čase postreku sa má pohybovať nad 7 °C
cesnak zimný	Fúzavka cesnaková	KARATE ZEON 5 CS	prvý postrek porastov po prvom oteplení nad 10 °C, ďalšie v 10-dňových intervaloch najmä v miestach pravidelného výskytu škodcu aj so zmáčadlom (DropFor, Silwet)
Mak (z jesennej sejby)	pleseň maková	CHAMPION 50 WG CUPROXAT SC KUPRIKOL 50	- ak sa v poraste jesenného maku objavia plesňou makovou napadnuté rastliny, celý porast sa môže dvakrát s 10-dňovým odstupom ošetriť niektorým z med'natých prípravkov - do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo - pri jednotení maku treba podozrivé rastliny vytrhať
okrasné rastliny zelenina	Padanie vzchádzajúcich rastlín	PREVICUR ENERGY OKRASNÉ RASTLINY PREVICUR ENERGY ZELENINA	preventívne ošetrenie výsevov alebo vzchádzajúcich rastlín vo forme zálievky
Krušpán (Buxus)	Vijačka krušpánová	DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY DURSBAN 480 EC KARATE ZEON 5 CS	postrek rastlín, na ktorých nájdeme húsenice alebo ich požerky na novonarastených výhonkoch
okrasné rastliny	Červce a Štítničky na okrasných rastlinách Puklice	DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY DURSBAN 480 EC KARATE ZEON 5 CS	- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť - izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovoľí) na balkóne či na dvore
okrasné rastliny	Molica skleníková na okrasných rastlinách Molica lastovičníková na okrasných rastlinách	DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY KARATE ZEON 5 CS	- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť - izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovoľí) na balkóne či na dvore
okrasné rastliny	Roztočce na okrasných rastlinách	APOLLO 50 SC NISSORUN 10 WP rozprašovač NISSORUN 10WP VERTIMEC 018 EC	- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť - izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovoľí) na balkóne či na dvore - prípravky Apollo a Nissorun ničia len vajíčka a mladé larvy škodcu, preto ich

okrasné rastliny	Strapky na okrasných rastlinách	DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY DURSBAN 480 EC KARATE ZEON 5 CS VERTIMEC 018 EC	<p>treba striedať s Vertimecom, ktorý ničí všetky pohyblivé štádiá roztočcov</p> <p>- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť</p> <p>- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore</p>
okrasné rastliny	Vošky na okrasných rastlinách	DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY DURSBAN 480 EC KARATE ZEON 5 CS	<p>- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť</p> <p>- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore</p>
Smrek	roztočec smrekový	APOLLO 50 SC NISSORUN 10WP	<p>- smreky, ktoré boli minulý rok napadnuté roztočcom smrekovým, sa môžu ošetriť na začiatku pučania, kedy sa liahnu larvy z prezimovaných vajíčok škodcu</p> <p>- uvedené prípravky sú účinné proti vajíčkam a mladým larvám</p>
Smrek	háľkotvorné kôrovnice (vošky)	DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY DECIS PROTECH OKRASNÉ RASTLINY DURSBAN 480 EC KARATE ZEON 5 CS	<p>postrek proti prezimujúcim jedincom krátko po vypučaní, ale ešte pred začiatkom tvorby šiškovitých hálok</p>